

NAROČILNICA ZA LABORATORIJSKE PREISKAVE

Priimek in ime	
Datum rojstva	
Spol	M Ž
Naslov	
KZZ	

Datum	
Ura odvzema	
Naročnik	
Zdravnik	
Opombe	

Biokemične preiskave (serum)	
AST	
ALT	
GGT	
ALKALNA FOSFATAZA	
CK	
LDH	
alfa AMILAZA	
LIPAZA	
BILIRUBIN - celokupni	
BILIRUBIN - direktni	
SEČNINA	
KREATININ	
URAT	
GLUKOZA	
HOLESTEROL	
TRIGLICERIDI	
HDL HOLESTEROL	
LDL HOLESTEROL	
ŽELEZO	
TIBC	
TRANSFERIN	
SATURACIJA TRANSFERINA	
FERITIN	
KALIJ	
NATRIJ	
KLORIDI	
KALCIJ	
FOSFAT	
MAGNEZIJ	
PROTEINI	
ALBUMIN	
RF	
CRP	
CRP visoko občutljiv	

Hematološke preiskave (EDTA)	
HEMOGRAM + DKS	
DKS ROČNO	
RETIKULOCITI	
SEDIMENTACIJA	
HbA1C	

Koagulacijske preiskave (Na-citrat)	
PČ, INR	
APTČ	
D-DIMER	

Urinske preiskave	
OSNOVNA ANALIZA	
SEDIMENT	
URICULT	
TEST NOSEČNOSTI	

Blato	
PARAZITI	
PRISOTNOST KRVI	
HELICOBACTER PYLORI	

Vitamini (serum)	
VITAMIN B12	
FOLNA KISLINA	
VITAMIN D	

Drugo (serum)	
IgA	
IgE	
NT-proBNP	
MIOGLOBIN	
TROPONIN I (hs)	
Anti-SARS-CoV-2	

Ščitnica (serum)	
TSH	
FT3	
FT4	
anti TPO	
anti TG	

Tumorski označevalci (serum)	
PSA - celokupni	
PSA - prosti	
Ca 125	
CEA	
Ca 19-9	
Ca 15-3	
alfa FETOPROTEIN	

Hormoni (serum)	
beta hCG	
FSH	
LH	
PROLAKTIN	
ESTRADIOL	
PROGESTERON	
TESTOSTERON - celokupni	
KORTIZOL	
DHEA-S	
iPTH	

Posebni odvzem	
HOMOCISTEIN	

Hitri test (serum ali EDTA)	
INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA	

Opombe:

--

PRIPRAVA NA ODVZEM KRVI



Pomembno je, da se na odvzem krvi ustrezno pripravite.

- Pridite v dopoldanskem času.
- Neposredno pred odvzemom se v čakalnici psihično in fizično sprostite.
- Eno uro pred odvzemom ne kadite.
- Bodite tešči, kar pomeni, da zadnjih 12 ur uživajte samo vodo.
- Dan pred odvzemom se izogibajte pretirani fizični aktivnosti.

Če vam odvzem krvi vzbuja nelagodje, to povejte in se prepustite našemu strokovno usposobljenemu in prijaznemu osebju.

Za obisk se ni potrebno naročiti. Pri vходу v laboratorij vzemite listek s številko in vstopite na sprejem, ko ste na vrsti.

Po zaključenem odvzemu si tampon pritiskajte na mesto vboda vsaj še 5 minut oziroma toliko časa, da se krvavitev popolnoma zaustavi. V nasprotnem primeru lahko pride do nastanka podplutbe.